

PRÉPARATION DE VOTRE VISITE

Voici quelques questions sur la prévention de l'infection par le VPH que vous pourriez poser à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous.

- Est-ce que je peux encore recevoir le vaccin contre le VPH à mon âge?

- Est-ce trop tard pour recevoir le vaccin si je suis déjà actif ou active sexuellement?

- Est-ce que GARDASIL[®]9 peut m'aider même si j'ai déjà contracté le VPH?

- Les femmes qui sont vaccinées par GARDASIL[®]9 doivent-elles quand même subir un test Pap à intervalles réguliers?

- Est-ce que je peux recevoir le vaccin GARDASIL[®]9 si j'ai déjà reçu le vaccin GARDASIL[®]*?

- Pourquoi se faire vacciner si on n'a qu'un seul partenaire sexuel?

- Est-ce que je dois recevoir les trois doses de GARDASIL[®]9?

- Depuis notre dernière discussion, mon statut conjugal a changé. Comment le vaccin GARDASIL[®]9 peut-il m'aider?

- Depuis notre dernière discussion, j'ai obtenu un résultat anormal à un test Pap. Comment le vaccin GARDASIL[®]9 peut-il m'aider?

GARDASIL[®]9 est un vaccin indiqué chez les personnes âgées de 9 à 45 ans pour la prévention de l'infection par le virus du papillome humain (VPH) des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58 et des maladies suivantes causées par les VPH de ces types contenus dans le vaccin : certains cancers de la tête et du cou, comme les cancers de la gorge et de l'arrière de la bouche, causés par le VPH des types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58. GARDASIL[®]9 a été approuvé **avec conditions**. Cela signifie qu'il a réussi l'examen de Santé Canada et qu'il peut être acheté et vendu au Canada, mais que le fabricant a accepté de mener d'autres études pour confirmer que le vaccin agit bien comme prévu. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec votre professionnel de la santé.

GARDASIL[®]9 est aussi indiqué chez : les personnes âgées de 9 à 45 ans pour la prévention de l'infection par le VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58 et des maladies suivantes causées par les VPH de ces types contenus dans le vaccin : cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin et de l'anus causés par le VPH des types 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58, verrues génitales (condylomes acuminés) causées par les VPH des types 6 et 11, lésions cervicales anormales et précancéreuses (modifications dans les cellules du col de l'utérus qui peuvent devenir cancéreuses) observées au test Pap et causées par le VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58, lésions anormales et précancéreuses du vagin, de la vulve (région génitale externe chez la femme) et de l'anus causées par le VPH des types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58.

GARDASIL[®]9 ne peut protéger la personne vaccinée contre toute maladie causée par d'autres types de VPH, virus ou bactéries, ni contre les types de VPH qu'elle pourrait déjà avoir contractés, mais la plupart des personnes n'ont pas contracté tous les types de VPH contenus dans le vaccin. GARDASIL[®]9 ne traite pas l'infection par le VPH ni les cancers et les maladies et ne prévient pas ses complications. GARDASIL[®]9 peut ne pas conférer une protection complète à toutes les personnes vaccinées. GARDASIL[®]9 ne supprime pas la nécessité du dépistage des cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, de l'anus et de certains cancers de la tête et du cou, comme les cancers de la gorge et de l'arrière de la bouche; les femmes doivent encore passer un dépistage du cancer du col de l'utérus de routine. GARDASIL[®]9 n'est pas recommandé pour une utilisation chez les femmes enceintes, et on ne doit l'employer durant la grossesse que si un médecin ou un professionnel de la santé croit que c'est absolument nécessaire. Une femme qui devient enceinte avant d'avoir reçu toute la série de vaccins doit terminer son calendrier de vaccination après la naissance de son enfant. Si vous allaitez, informez-vous auprès de votre médecin ou d'un professionnel de la santé. GARDASIL[®]9 risque de provoquer des effets secondaires et des réactions allergiques. Les effets secondaires les plus souvent observés sont la douleur, l'enflure, la rougeur, la démangeaison, une ecchymose (bleu), un saignement et une masse au point d'injection, de même que des maux de tête, de la fièvre, des nausées, des étourdissements, de la fatigue, de la diarrhée, de la douleur abdominale et des maux de gorge. Un évanouissement peut survenir après l'injection du vaccin contre le VPH. Les signes d'une réaction allergique comprennent les difficultés respiratoires, la respiration sifflante (bronchospasme), l'urticaire et l'éruption cutanée. Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète; en cas d'effet inattendu pendant la prise de GARDASIL[®]9, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien ou pharmacienne. Contactez votre médecin ou votre professionnel de la santé pour déterminer si GARDASIL[®]9 est une option qui pourrait vous convenir.

Vous trouverez de l'information sur GARDASIL[®]9 dans la monographie et les Renseignements pour les consommateurs, accessibles à l'adresse http://www.merck.ca/static/pdf/GARDASIL_9-PM_F.pdf.

VPH = virus du papillome humain.

* GARDASIL[®] n'est plus offert/commercialisé au Canada.

Ce guide de discussion sur GARDASIL[®]9 vous est présenté par Merck Canada.



© 2018, 2023. Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
© Merck Sharp & Dohme LLC, utilisée sous licence.

Merck Canada Inc.
16750, route Transcanadienne,
Kirkland (Québec), Canada, H9H 4M7
514-428-7920


GARDASIL[®]9
[vaccin recombinant nonavalent
contre le virus du papillome humain]

 MEMBRE DE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

